


ヒトは寝て食べて出して
はじめて元気が出る動物です
第25回母乳哺育学会招請講演
2010年9月25日

公益社団法人地域医療振興協会
東京ベイ浦安市川医療センター
子どもの早起きをすすめる会発起人
日本小児科学会
こどもの生活環境改善委員会
副委員長 神山 潤

2005年子ども白書によると


- 1979年には保育士の8.1%が、保育園に通う児が朝からあくびをすると感じ、10.5%がすぐに疲れた、と訴えると感じていた。
- 2000年にはこの数字はそれぞれ53.2%と76.6%に上昇した。

夜10時以降に就床する3歳児の割合



*Armstrong et al, **加藤, *** Kohyama et al., **** Kohyama et al.

<赤ちゃんが寝る時間の国際比較>



* P&G Pampers.com による調査より(2004年3-4月実施、対象0～36ヶ月の子供)

** パンパース赤ちゃん研究所調べ(2004年12月実施、対象0～48ヶ月の子供)

本日のキーワード 6つ

大切なのは： 朝の光、昼間の運動

とんでもないのは： 夜の光

知っていただきたいのは：

生体時計、セロトニン、(メラトニン)

ヒトは24時間いつも同じに動いているロボットではありません。

徒競走のスタートラインに並ぶと心臓がどきどきするのはどうしてでしょう？






あなたが心臓に「動け」と命令したから心臓がどきどきしたのではありません。自律神経が心と身体の状態を調べて、うまい具合に調整するからです。
自律神経には

昼間に働く交感神経と、夜に働く副交感神経とがあります

	昼間働く 交感神経	夜働く 副交感神経
心臓	どきどき	ゆっくり
血液	脳や筋肉	腎臓や消化器
黒目	拡大	縮小

ヒトは周期24時間の地球で生かされている動物なのです。



様々な概日リズム(睡眠・覚醒、体温、ホルモン)の相互関係



朝の光で周期25時間の生体時計は
毎日周期24時間にリセット


コルチコステロイドの日内変動
↓
朝高く、夕方には低くなるホルモン

様々な概日リズム(睡眠・覚醒、体温、ホルモン)の相互関係




さまざまなリズムを調節しているのが
生体時計 です。

均値



朝の光で周期25時間の生体時計は
毎日周期24時間にリセット





コルチコステロイドの日内変動

↓
朝高く、夕方には低くなるホルモン


「目覚まし時計」は脳にある

人間の生体リズムをコントロールする体内時計は、1日約 **24.5時間** のサイクルになっている。そのため脳の視交叉上核が毎朝、太陽の光を視覚で認識することによって生体リズムを1日24時間に調整している。






生体
リズムが
毎日
少しずつ
遅く
ずれます
(フリー・ラン)。
生体時計が自由
(フリー)に
活動(ラン)する。
このズレは
生体時計
と
地球の周期
との差です。



「目覚まし時計」は脳にある

人間の生体リズムをコントロールする体内時計は、1日約 **24.5時間** のサイクルになっている。そのため脳の視交叉上核が毎朝、太陽の光を視覚で認識することによって生体リズムを1日24時間に調整している。







図 1 光によるヒト生物リズムの位相反応

日中の時間帯の高照度光は位相反応をおこさない(上段). 早朝の時間帯に高照度光を照射すると、深部体温および睡眠相が早まる(中段). 前夜の就寝時刻前後に高照度光を照射すると深部体温および睡眠相が遅れる(下段).



Current Biology 17, 1996-2000, 2007 Report

The Human Circadian Clock's
Seasonal Adjustment Is Disrupted
by Daylight Saving Time

実際
睡眠時間は
冬に長く、夏に短い。
冬は朝寝坊で、
夏は早起き。

Thomas Kantermann,¹ Myriam Juda,¹ Martha Merrow,²
and Till Roenneberg^{1,*}

¹Ludwig-Maximilian-University
Goethestrasse 31
D-80336 Munich
Germany

²Department of Chronobiology
University of Groningen
9750AA Haren
The Netherlands


報告者(報告年)	対象	夜型では……
Yokomakuら (2008)	東京近郊の4-6歳 138名	問題行動が高まる可能性
Giannottiら (2002)	イタリアの高校生6631人	注意力が悪く、成績が悪く、イライラしやすい。
Wolfson ら (2003)	中学生から大学生	夜ふかし朝寝坊で学力低下。
Gauら(2004)	台湾の4-8年生1572人	moodiness(気難しさ、むら気、不機嫌)との関連が男子で強い。
原田(2004)	高知の中学生613人	「落ち込む」と「イライラ」の頻度が高まる。
Caciら(2005)	フランスの学生552人	度合いが高いほど衝動性が強い。
Gainaら(2006)	富山の中学生638人	入眠困難、短睡眠時間、朝の気分の悪さ、日中の眠気と関連。
Gauら(2007)	台湾の12-13歳1332人	行動上・感情面での問題点が多く、自殺企図、薬物依存も多い。
Susman ら(2007)	米国の8-13歳111人	男児で反社会的行動、規則違反、注意に関する問題、行為障害と関連し、女児は攻撃性と関連する。
国際がん研究 機関 2006		発がん性との関連を示唆

Total sleep time


Nighttime sleep + daytime sleep

0-3歳、2007年の調査

- Predominantly Caucasian = 7960
 - United States (US), Canada (CA), United Kingdom (UK), Australia (AU), New Zealand (NZ)
- Predominantly Asian = 20,327
 - China (CN), Hong Kong (HK), India (IN), Indonesia (ID), Japan (JP), Korea (KR), Malaysia (MY), Philippines (PH), Taiwan (TW), Thailand (TL), Vietnam



調査参加16か国中、日本の赤ちゃんの睡眠時間が最も少なかった。




Sleep Duration From Infancy to Adolescence: Reference Values and Generational Trends

Ivo Iglovstein, Oskar G. Jenni, Luciano Molinari and Remo H. Largo
Pediatrics 2003;111;302-307


睡眠覚醒リズムの確立に関する要素は？

- ・ 妊娠末期の母が早く寝ることで、生後1ヶ月時の児の夜間の睡眠時間が長くなる。
→ ヒトでも胎児期から母親の生活リズムへの同調が始まっていることが示唆(早瀬麻子、島田三恵子ら。小児保健2008;67:746)。
- ・ 昼夜の区別のない、いつも明るい環境では、生体時計の中の神経細胞同士のリズムの同調が、成マウスでも新生マウスでも難しくなる。
→ 生体時計の機能維持には昼夜の区別が重要？(Ohta, H. et al. *Nat. Neurosci.*, 2005;8:267. *Pediatr. Res.*, 2006; 60: 304.)


1歳6ヶ月児の睡眠覚醒リズム



1歳6ヶ月児の睡眠覚醒リズム



夜ふかしでは睡眠時間が減る



ヒトは昼間は寝にくい昼行性の動物！夜行性じゃない！

睡眠の心身への影響

睡眠の研究方法の問題点

4時間睡眠で6晩 (8, 12時間睡眠と比較)

- 耐糖能低下（糖尿病）、夕方のコルチゾール低下不良（→肥満）、
交感神経系活性上昇（高血圧）、ワクチンの抗体産生低下（免疫能低下）

→ **老化と同じ現象**

Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function

Summary

Background Chronic sleep debt is becoming increasingly common and affects millions of people in more-developed countries. Sleep debt is currently believed to have no adverse effect on health. We investigated the effect of sleep debt on metabolic and endocrine functions.

Methods We assessed carbohydrate metabolism, thyrotropic function, activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, and sympathovagal balance in 11 young men after time in bed had been restricted to 4 h per night for 6 nights. We compared the sleep-debt condition with measurements taken at the end of a sleep-recovery period when participants were allowed 12 h in bed per night for 6 nights.

Findings Glucose tolerance was lower in the sleep-debt condition than in the fully rested condition ($p<0.02$), as were thyrotropin concentrations ($p<0.01$). Evening cortisol concentrations were raised ($p=0.0001$) and activity of the sympathetic nervous system was increased in the sleep-debt condition ($p<0.02$).

Interpretation Sleep debt has a harmful impact on carbohydrate metabolism and endocrine function. The effects are similar to those seen in normal ageing and, therefore, sleep debt may increase the severity of age-related chronic disorders.

Lancet 1999 **354**: 1435–39

睡眠不足で風邪ひきやすくなる

睡眠不足だったり、眠りの質が悪いほど風邪をひきやすいことが米カーネギーメロン大などの研究チームが実施した調査で分かり、今月の米医師会誌（JAM）に掲載した。予防には目じろから、十分な睡眠が必要と言われるが、それを裏付けたことになる。

7時間未満…8時間以上の2.9倍

うたた寝「あり」…「ほとんどなし」の5.5倍

免疫力に影響？

未満の人では8時間以上の人比べて風邪をひいた人の割合は2・9倍も高いことが分かった。また、ベッドで寝ている時間の割合が92%未満の人では大半をべる。

調査は00～04年、公募に応じた健康な男女153人（21～55歳）を対象に実施された。睡眠時間のほかに、熟睡度を測るためにベッドで寝た時間を、2週間にわたり測るためべつに調査は00～04年、公募に応じた健康な男女153人（21～55歳）を対象に実施された。

△に掲載した。予防には目じろから、十分な睡眠が必要と言われるが、それを裏付けたことになる。

睡眠時間のほかに、熟睡度を測るためにベッドで寝た時間を、2週間にわたり測るためべつに調査は00～04年、公募に応じた健康な男女153人（21～55歳）を対象に実施された。

△に掲載した。予防には目じろから、十分な睡眠が必要と言われるが、それを裏付けたことになる。

Sleep habits and susceptibility to the common cold.

Cohen S, Doyle WJ, Alper CM, Janicki-Deverts D, Turner RB.

Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA. scohen@cmu.edu

BACKGROUND: Sleep quality is thought to be an important predictor of immunity and, in turn, susceptibility to the common cold. This article examines whether sleep duration and efficiency in the weeks preceding viral exposure are associated with cold susceptibility. **METHODS:** A total of 153 healthy men and women (age range, 21–55 years)

volunteered to participate in the study. For 14 consecutive days, they reported their sleep duration and sleep efficiency (percentage of time in bed actually asleep) for the previous night and whether they felt rested. Average scores for each sleep variable were calculated over the 14-day baseline. Subsequently, participants were quarantined, administered nasal drops containing a rhinovirus, and monitored for the development of a clinical cold (infection in the presence of objective signs of illness) on the day before and for 5 days after exposure. **RESULTS:** There was a graded association with average sleep duration: participants with less than 7 hours of sleep were 2.94 times (95% confidence interval [CI], 1.18–7.30) more likely to develop a cold than those with 8 hours or more of sleep. The association with sleep efficiency was also graded: participants with less than 92% efficiency were 5.50 times (95% CI, 2.08–14.48) more likely to develop a cold than those with 98% or more efficiency. These relationships could not be explained by differences in prechallenge virus-specific antibody titers, demographics, season of the year, body mass, socioeconomic status, psychological variables, or health practices. The percentage of days feeling rested was not associated with colds. **CONCLUSION:** Poorer sleep efficiency and shorter sleep duration in the weeks preceding exposure to a rhinovirus were associated with lower resistance to illness.

寝ないと 太る

Taheri S, Lin L, Austin D,
Young T, Mignot E.

Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index.

**PLoS Med. 2004
Dec;1(3):e62.**





Figure 2. The Relationship between BMI and Average Nightly Sleep
Mean BMI and standard errors for 45-min intervals of average nightly sleep after adjustment for age and sex. Average nightly sleep values predicting lowest mean BMI are represented by the central group. Average nightly sleep values outside the lowest and highest intervals are included in those categories. Number of visits is indicated below the standard error bars. Standard errors are adjusted for within-subject correlation.

■図1 睡眠時間と死亡率の関係



米国で男性48万841人、女性63万6095人を6年間前向きに追跡。
7時間を1とした場合の各時間のハザード比（死亡の相対リスク）

セロトニン

- こころを穏やかにする神経伝達物質

運動と関係する神経系 → セロトニン系

セロトニン系：

脳内の神経活動の
微妙なバランスの維持


セロトニン系の活性化

(歩行、咀嚼、呼吸

= リズミカルな筋肉活動)

- 行動中の脳活動の安定化に寄与
- 運動すると「気分がいい」
- 障害で精神的な不安定
(強迫神経症、不安障害、気分障害)

セロトニン系は脳内に
広範に分布している



セロトニン神経系の活動は
stateにより変化する



的などセロトニンは分泌される
脳幹で記録されるセロトニン分泌ニューロンの活性は、ネコの覚醒状態によって異なる。図はジェイコブズ（Barry Jacobs）の研究に基づく。ネコの絵の下に神経活動の記録を記してあり、個々の活動電位は短い縦線で示す。

表 1 セロトニン神経系と攻撃性の関係

	セロトニン神経系の変化	攻撃性の変化
実験動物 (ラット・マウス)	セロトニン神経系の破壊 薬物による活動低下 遺伝子操作による不活化 脳内セロトニン量の増加	攻撃性の増加 攻撃性の増加 攻撃性の増加 家畜化による攻撃性の低下
野生動物 サル	セロトニン神経の薬物による活動低下	社会活動の低下 孤立化
野生サル	脳内セロトニン量の低下	攻撃性の増加 社会地位の変動 攻撃性の増加
ヒト	脳脊髄液内セロトニン代謝物の低下 脳内セロトニン量の低下 MAO-A 遺伝子欠損	攻撃性・衝動性 暴力犯罪者 自殺行為者 攻撃性の増加

低セロトニン症候群

Aggression, Suicidality, and Serotonin

V. Markku I. Linnoila, M.D., Ph.D., and Matti Virkkunen, M.D.

Studies from several countries, representing diverse cultures, have reported an association between violent suicide attempts by patients with unipolar depression and personality disorders and low concentrations of the major serotonin metabolite 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the cerebrospinal fluid (CSF). Related investigations have documented a similar inverse correlation between impulsive, externally directed aggressive behavior and CSF 5-HIAA in a subgroup of violent offenders. In these individuals, low CSF 5-HIAA concentrations are also associated with a predisposition to mild hypoglycemia, a history of early-onset alcohol and substance abuse, a family history of type II alcoholism, and disturbances in diurnal activity rhythm. These data are discussed in the context of a proposed model for the pathophysiology of a postulated "low serotonin syndrome."

(*J Clin Psychiatry* 1992;53[10, suppl]:46-51)

衝動的・攻撃的行動、自殺企図

髄液中の5HIAA濃度の低下

日中の活動リズムの異常 と関連。

セロトニンの活性を高めるのは？

リズミカルな筋肉運動

そして朝の光





経済を脳から解く

「ニューロエコノミクス（神経経済学）」という新しい研究分野がある。脳の働きから、人間の経済活動を読み解くことを目指す分野だ。

経済学はこれまで、主に人間は合理的な行動をするというモデルに基づいていた。だが、現実にはそれだけでは説明できない現象が多い。

「人間の行動を生み出す脳の働きを、脳科学の手法を用いて解明し、新しい経済のモデルづくりを目指します」。大阪大社会経済研究所の田中沙織・特任准教授は研究内容を、こう説明する。

田中さんは、人間が短期的に報酬を予測するときと、長期的に報酬を予測するとき

では、脳の活動する場所が違うことをみつけた。目先の欲しいものにすぐに手を出しか、将来の利益を選ぶかの判断に関係しているという。

さらに、こうした選択をする際、脳内物質のセロトニンが足りないと、衝動的に目先の報酬を選びがちになることも突き止めた。

人間はどれくらい先の報酬まで考慮して行動するのか。脳の活動を調べると、その期間に応じて働く複数の神経回路があり、セロトニンがこれらの働きを調整している。

セロトニンが不足すると、こうした調整能力が失われ、将来を見越した最適な行動がとれなくなるらしい。

セロトニンがたりないと、20分後の20円より、
5分後の5円を求める。

報酬予測回路

目先の報酬を予測しているときは、前頭葉眼窩(がんか)皮質や線条体の下部を通る回路(情動的な機能にかかる)が活動し、将来の報酬を予測しているときは、背外側前頭葉前野や線条体の上部を通る回路(認知的な機能にかかる)が活動する(Tanaka SC,らNat Neurosci. 2004 Aug;7(8):887-93.)。

被験者の脳内のセロトニン濃度が低いときには、短期の報酬予測回路がより強く活動し、セロトニン濃度が高いときには、長期の報酬予測回路がより強く活動(Tanaka SCらPLoS One. 2007 Dec 19;2(12):e1333.)。

脳内のセロトニン濃度が低いときには、衝動的に目先の報酬を選びがち(Schweighofer NらJ Neurosci. 2008 Apr 28;28(17):4528-32.)。

東路につく人で込み合う夜の駅で、鉄道係員への暴力行為が増えている。日本民営鉄道協会（民鉄協）によると、JR各社や私鉄など25事業者で昨年起こった暴力は869件で、過去5年で最悪を更新。加害者の中には酔客だけでなく、素面だった人もいる。彼らはなぜ殴ってしまったのかうか。

（黒田淳嗣）

酔客だけではない

「駆負のくせに分からないのか！」男は叫び、駆負の胸を殴りつけた。

深夜の東急電鉄日暮駅で昨年、JR目黒駅の終電時刻を男に聞かれた駆負がJRの窓口を案内しようとしたところ、男は突然怒り出した。終電間際の時間帯なので、間違いないようにご案内したのですが」と重々。男は酒を飲んでいた。

JR協会のまごめでは、加害者が飲酒していた暴行事件は49件で、昨年全体の57.4%。東急では、「暴力行為は夕方以降、飲酒されている場合が多い」と頃かす。

しかし、統計では「飲酒なし」も241件と3割弱に上る。JR東日本は「突然笑いを出される場合もあり、一概に『うつむき眼を向ける』とは言えない」と対策の難しさを語る。「突然笑るのは、運動が抑えられなくなる脳の一時的な機能障害なんです」と説明するのは、東邦大学医学部の有田秀穂教授（統合生理学）。「脳には衝動をコントロールする「前頭前野」という部位があり、円滑に動かせるために「ゼロトニン」という物質が分泌されるしかし、ゼロトニンは疲れやストレスで減少してしまう。こうした影響からか、朝よりも疲れがピークに達する夜、週末に向けて駆負への暴

止まらない駆負への暴力行為




④夕刻、帰宅ラッシュで込み合うJR京浜東北線。通勤ラッシュ時よりも蓄積されたストレスは大きい？（本文とは関係ありません）＝JR東京駅
⑤民鉄協などが駅構内に張り出した暴力防止の啓発ポスター＝JR新横浜駅

運動と日光浴でストレス対策を

殴り返して「ない」という概念から、駆負がターゲットになっているという指摘もある。相次ぐ暴行を受ける民鉄協などでは今月、暴力防止の啓発ポスターを制作。ひびの入った家族の写真が、「ほんの一瞬、たった一度の暴力行為が、大切なものをすべて壊す」と訴える。「キレる」仕組みを知り、予防することが生活を守る一步になりそうだ。

運動不足と昼夜逆転（太陽光受光減）でのセロトニン欠乏が問題、と有田教授。寝不足で元気が出なくて運動不足でセロトニン欠乏というルートもあるのでは？



増える中高年の犯行

民鉄協が把握した鉄道係員への暴力行為の件数は、19年度（751件）、20年度（752件）と比べ、昨年度は869件と大きく伸びた。発生場所は改札が45・2%で最も多く、ホーム（29・6%）、車内（12・1%）と続いた。

一方、警察庁の統計によると、過去10年で暴行による痴兒人間は30歳～50代で大幅増。30代は12年が1502人、21年が4846人、40代は12年が11255人、21年が4244人、50代は12年が12255人、21年が3318人となっている。

「最近見えてるのだといふ。P.C.生活に満ちて、なぜ、暴行は年々増加傾向にあるのか。セロトニンは、運動や太陽光を浴びることで分泌が促進される。有田教授は、パソコンが爆発的に普及した「IT革命」や、ネットカフェなどで一時的なものため「突然運動不足と昼夜逆転生活にな

り、セロトニン欠乏に陥っている」とみる。警察庁の犯罪情勢では、暴行事件が多く発生する傾向にある。機械障害はあくまで「セロトニンが爆発的に普及した「IT革命」や、ネットカフェなどで24時間営業店の増加で人々が運動不足と昼夜逆転生活にな


り、セロトニン欠乏で衣服ができるでしょう」と話す。

セロトニン欠乏は駆負への暴力の一つの要因と考えられ、「客観的そのため駆負は

「寝ながら、駆負がターゲットになっている」という指摘もある。相次ぐ暴行を受ける民鉄協などでは今月、暴力防止の啓発ポスターを制作。ひびの入った家族の写真が、「ほんの一瞬、たった一度の暴力行為が、大切なものをすべて壊す」と訴える。

小中学校と高校での暴力行為

合計



進む低年齢化

小中高校生の暴力、過去最多

小中学生と高校生の暴力行為が平成21年度の文部科学省調査で約6万1千件に上り、過去最高となつたことが14日、分かつた。小中学生の増加が顕著で、同省では「感情をコントロールできず、キレる子供が目立つ。暴力の低年齢化が進んでいる」と分析している。

同日公表された「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果によると、全国の小中学校・高校などの児童・生徒が校内外で起こした暴力行為は6万913件で、前年度比2・1%増。うち中学生は4万3715件で2・2%増、小学生は7115件で9・7%増。高校生だけは2・9%減って、1万83件だった。

暴力の内容では、児童・生徒同士のケンカやいじめなど「生徒間暴力」が最も多く3万4277件。教師を殴ったり、胸ぐらをつかんだりする「対教師暴力」も830

4件あり、いずれも増加傾向だった。物を壊す「器物損壊」(1万

6604件)をのぞくと、全体の26・4%が、被害者が病院で受けたほどの激しい暴力行為。警察や児童相談所から補導などの措置を受けた児童・生徒も4998人に上った。

セロトニンと暴力と睡眠不足

- セロトニンの働きはリズミカルな筋肉運動で高まる(Jacobs BL, Azmitia EC. 1992)。
- 夜ふかし朝寝坊、時差ボケ状態(昼夜逆転)や睡眠不足では元気が出ず、リズミカルな筋肉運動どころではなくなり、セロトニンの働きが高まらないことを懸念。
- 脳内のセロトニン濃度が低いときには、短期の報酬予測回路がより強く活動(Schweighofer N, et al. 2008)。
- 睡眠不足では前頭前野が担っている衝動性を抑える機能が発揮されにくい(Yoo SS, et al. 2007)
- 前頭前野のセロトニンが足りないと、前頭前野が担っている衝動性を抑える機能が発揮されにくい(Tekin S, Cummings JL, 2002)

Q: 寝不足だと思う、 Ans: ハイ

小学生(1522人) 47.3%

中学生(1497人) 60.8%

高校生(928人) 68.3%

2006年 全国養護教員会 調べ

寝不足の原因

- 小学生(720人)

- ① 眠れない(43.8%)、② テレビ・ビデオ(39.3%)、
③ 勉強(26.3%)、④ 家族の寝る時刻が遅い(22.6%)、
⑤ 本・マンガ(21.9%)

- 中学生(910人)

- ① テレビ・ビデオ(44.5%)、② 勉強(32.2%)、
③ 眠れない(31.1%)、④ 本・マンガ(25.9%)、
⑤ 電話・メール(23.3%)

- 高校生(634人)

- ① 電話・メール(42.4%)、② テレビ・ビデオ(38.8%)、
③ 眠れない(27.1%)、④ 勉強(23.2%)、⑤ 本・マンガ(21.0%)

不適切な睡眠衛生 と 睡眠不足症候群

- 以下の適切な睡眠衛生からの逸脱による不眠。
- 適切な睡眠衛生の基本は、朝日の受光、
昼間の心身の活動、規則的で適切な食事、夜間の適切な睡眠環境(暗さ、静けさ、温度、湿度)。
- 不適切な薬物(含むアルコール)使用も、当然睡眠衛生の基本に反する。

- 睡眠不足症候群は、正常な覚醒状態維持のために必要な夜間の睡眠をとることが出来ず昼間に眠気が生じる。
- 患者自身は慢性の睡眠不足にあることを自覚していない。
- 症状: 攻撃性の高まり、注意・集中力・意欲の低下、疲労、落着きのなさ、協調不全、倦怠、食欲不振、胃腸障害などが生じ、その結果さらに不安や抑うつが生じる場合もある。
- 睡眠を十分とれる週末や休暇時には症状は軽快する。

不適切な睡眠衛生 と 睡眠不足症候群

- 以下の適切な睡眠衛生からの逸脱による不眠。
- 適切な睡眠衛生の基本は、
- 睡眠不足症候群は、正常な覚醒状態維持のために必要な夜間の睡眠をとることが出

日本では、多くの方が
不適切な睡眠衛生に起因する
睡眠不足症候群！？

に不安や抑うつが生じる場合
もある。

- 睡眠を十分とれる週末や休暇時には症状は軽快する。

では対策は？

- SHT(sleep health treatment)

基本は4つ

- 朝の光を浴びること
- 昼間に活動すること
- 夜は暗いところで休むこと
- 規則的な食事をとること
- 眠気を阻害する嗜好品(カフェイン、アルコール、ニコチン)、過剰なメディア接触を避けること

「眠れません」
「では睡眠薬を」
から「では1日の
様子を伺わせて
ください。」に。




図 5-9 インスリン値と血糖値の平均変動



深夜23時 深夜 幼児はこんなに街にいる



2003年7月

キレル子

痴呆

生活習慣病



早起き 早寝 朝ごはん
それに 朝ウンチ



うんちっち!のうた CD 発売中

ネットショップ、ファックスでご購入できます。下記必要事項を記入の上、お申込みください。

必要事項

①希望曲 ②氏名 ③送付先の住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

ネットショップ <http://www.toilet.or.jp/uta/> FAX 03-3580-7176


ネットショップで
試聴もできるよ！



お問い合わせ：日本トイレ研究所〒105-0001 東京都港区赤坂1-11-7 第2文成ビル3F TEL03-3580-7487

うんちっち!のうた

うんちっち体操
イフスト村



子どもの健康は、
うんちから。

うんちからの健康教育
を実現します！みんなで
トイレが好きになっていい
うんちをしよう！

定価¥1,000（税抜¥953）

収録曲

1. うんちっち!のうた
2. Poo-Poo song
3. カラオケ

Lab.
日本トイレ研究所

日本トイレ研究所

2009 6/12 (金)

朝日

第3種郵便物認可

ひと

「うんち王子」がトイレを変える

かとう
加藤 あつし
さん(36)

「トイレや健康の大切な話をします」。王冠にマント姿の「うんち王子」に変身すると、子どもたちは「えーっ」と大喜び。良いうんちを当てるクイズでは、競って手を挙げる。小学校低学年向けの出前教室で「朝1杯の水を飲む」といった排便のコツや、和式便所での足の置き方を伝授してきた。トイレ環境の改善に取り組む民間団体「日本トイレ研究所」（東京）の所長を務める。

名古屋市出身で、大学では建築を専攻した。96年に設計事務所に就職したが、建物より住環境に興味が向き、死ぬまで暮らしひに欠かせないトイレに「生活の鍵がある」と考えた。97年、研究者らが有志で作った「日本トイレ協会」に転職し、出前教室や災害トイレ車の開発などを担

当した。活動に賛同する自治体や企業が増え、08年、協会から社会事業を引き継いで研究所ができた。

「暗くて臭いイメージの学校トイレを楽しく変えたい」と頭をひねる。今春、出前教室の内容を日本語と英語で歌にしたCD「うんちっちはうた」を発売し、歌に合わせて体操を踊る。出前教室とセットで学校トイレを改修する試みも始めた。

「変身」するきっかけは昨年、言葉の通じない東ティモールでの活動だった。夢は、様々な国籍の子どもを招いてトイレ教室を開き、体操を踊ること。「体操楽しかった」「トイレをきれいに使うね」。子どもたちの手紙が王子の宝物だ。

文・見市紀世子

写真・福岡亞純





うんちのいろいろ



げんきな、うんち。
ぼくは、げんきいっぱいのうんち、キラキラプリンスくん。
げんきいっぱいのうんちは、きいろっぽいちゃいろをしているよ。
においもくさくないんだよ！するっとでてくるのがとくちょうだ。



かたい、うんち。
ぼくは、カチカチプリンスくん。
ちからをいれても、なかなかでてこないよ。
すいぶんがすくなくて、こげちゃいろをしているのがとくちょうだ。



やわらかい、うんち。
ぼくは、ドロドロプリンスくん。
とてもくさくて、おなかがいたくなるのがとくちょうだよ。
どろどろしていて、トイレにいくのがまんできないんだ。



ほそながい、うんち。
ぼくは、ヒヨロヒヨロプリンスくん。
やわらかくて、だしてもおなかがすっきりしないんだ。
とくちょうは、ほそいかたちだよ。

- まず、上のボタンからカレンダーを表示して、印刷しましょう。


- 印刷したカレンダーに名前を書き込みましょう。

- あとは、毎日のうんちの状態と回数をカレンダー上に書き込みましょう。

- メモスペースに、うんちの特徴や食べたものも書いておくとうんちと食べものとの関係がよくわかります。

主な部位別がん死亡率の推移

人／人口10万人当たり



(注) 肺がんは気管、気管支のがんを、子宮がんは子宮頸がんを含む。大腸がんは結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸のがんの計。


(資料)厚生労働省「人口動態統計」

ビジュアル図
断体と健康シリーズ

元気のしるし 朝うんち

うんちのお便り出しました

監修 斎藤弘人 摂取栄養士 食生活指導士 関野 真二
内視鏡検査 日本トイレ研究所 代表理事 鈴木 勤



早起きサイト




「子どもの早起きをすすめる会」 結成しました！


～朝陽をあびて 昼間は大活躍 バタンきゅう～



<http://www.hayaoki.jp>


コルチコステロイド分泌を促すACTHは、朝起きたい時間の前から分泌が始まる。






週に50時間以上労働している就業者の比率

(04年発表の国際比較データから)



2007年2月8日朝日新聞

国・地域別の睡眠時間



各地域500名 18-64歳 (2008年8月20日から9月1日の調査)

日本人全体の睡眠時間

(時間)
8.5

NHK調べ 10歳以上

8.0

7.5

7.0

0.0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 (年)

出典：国民生活時間調査より

1995年以降、睡眠時間は
これ以上減らせない下限に達した。

(表1)世界銀行等のデータによる世界各国の労働生産性(2004年)


順	国名	労働生産性	順	国名	労働生産性
1	ルクセンブルグ	105,710	26	マルタ	50,978
2	アイルランド	86,025	27	ニュージーランド	46,937
3	米国	82,928	28	南アフリカ	44,224
4	ベルギー	78,292	29	スロベニア	44,203
5	ノルウェー	77,600	30	韓国	43,696
6	イタリア	73,259	31	ハンガリー	43,574
7	フランス	71,849	32	チェコ	42,127
8	オーストリア	70,686	33	ポルトガル	40,240
9	英國	65,881	34	スロバキア	36,138
10	フィンランド	65,612	35	ポーランド	35,732
11	オランダ	65,016	36	クロアチア	34,656
12	ドイツ	64,673	37	エストニア	32,972
13	香港	64,480	38	アルゼンチン	32,916
14	デンマーク	63,412	39	リトアニア	31,351
15	オーストラリア	63,343	40	モーリシャス	30,480
16	スウェーデン	63,055	41	チリ	29,903
17	カナダ	62,455	42	トリニダート・トバゴ	28,206
18	スペイン	59,520	43	アルジェリア	27,398
19	日本	59,050	44	ラトビア	26,483
20	アイスランド	58,867	45	マケドニア	25,664
21	スイス	58,338	46	マレーシア	25,615
22	シンガポール	57,598	47	トルコ	24,946
23	ギリシャ	56,687	48	メキシコ	24,653
24	キプロス	55,725	49	コスタリカ	24,382
25	イスラエル	52,770	50	ブルガリア	21,454

単位:購買力平価換算ドル
(世界銀行換算レート)

「労働生産性」とは一定時間内に労働者がどれくらいのGDPを生み出すかを示す指標。
2004年度の結果(米国を100)によるとユーロ圏87%、英83%、OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 経済協力開発機構)加盟国の中平均75%だが、日本は71%。


これはOECD加盟30カ国中第19位、主要先進7カ国間では最下位。


残業(睡眠時間が犠牲)
↔ 低い労働生産性



1998年以降自殺者が急増3万人を越える

自殺者数と完全失業率の推移






セロトニンと自殺と睡眠不足

- セロトニンの働きはリズミカルな筋肉運動で高まる(Jacobs BL, Azmitia EC. 1992)。
- 夜ふかし朝寝坊、時差ボケ状態や睡眠不足では元気が出ず、リズミカルな筋肉運動どころではなくなり、セロトニンの働きが高まらないことを懸念。
- 脳内のセロトニン濃度が低いときには、短期の報酬予測回路がより強く活動(Schweighofer N, et al. 2008)。
- 自殺した方の前頭前野ではセロトニンが減っている(Leyton M, et al. 2006)。
- 睡眠不足と自殺との関連が指摘(Liu X. 2004)
- 睡眠不足では前頭前野が担っている衝動性を抑える機能が発揮されにくい(Yoo SS, et al. 2007)
- 前頭前野のセロトニンが足りないと、前頭前野が担っている衝動性を抑える機能が発揮されにくい(Tekin S, Cummings JL, 2002)

親子の読み聞かせは 「心の脳」に働きかける



泰羅雅登




東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
認知神経生物学分野 教授

子供の脳活動



Brain activity of the child.

お母さんの読み聞かせを
聞いてくるときの反応




边缘系に活動
感情・情動
に関わる脳
心の脳に活動


お母さんはどう？



前頭前野が活発に



音読




読み聞かせ

読み聞かせで前頭前野を活発にしよう

- ・子どもに読み聞かせていると、親の前頭前野が活発になる。
- ・前頭前野は自殺の衝動を抑える！
- ・お父さんに読み聞かせをしてもらおう！

身体はもっとも身近な自然

- ヒトは寝て食べて出して初めて脳と身体の働きが充実する昼行性の動物。
- 寝不足は万病のもと。
- 最も身近な自然である[あなた自身の身体の声に耳を傾け](#)日々を過ごしてください。
- 身体を頭でコントロールすることは無理。
- 自分の身体を大事にしてください。
- 最も身近な自然である身体に、畏れと謙虚さとをもちかつ奢りを捨てて相対してください。



ねむり学入門

神山 潤

KOHYAMA
Jun



よく眠り、
よく生きるための
16章

よく眠ることは、よき生につながる
睡眠をめぐる“脳・こころ・身体・生活”的科学

新曜社

眠る門には福来たる